



# Grandes Cultures

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

**REGION LORRAINE**

Bulletin technique n° 25 du 17 octobre 2000

## Colza

Stade 4-5 feuilles à 8-10 feuilles avec élongations en parcelles denses et développées.

### Charançon du bourgeon terminal

Le vol se poursuit localement mais le niveau de capture est en général faible : les conditions climatiques récentes étaient peu favorables à l'activité des charançons et elles le restent. Dans certains secteurs, le vol n'a pas commencé : Ouest de la Meuse, Vosges. Ailleurs le maximum de vol n'est pas atteint et les pontes n'ont pas débutées.

**Attendre pour intervenir.**

### Pucerons

Les populations de pucerons verts (*myzus persicae*) se maintiennent dans les parcelles précoces non protégées. Quelques pucerons aptères (sans ailes) sont observés sur colzas plus tardifs (5-7 feuilles) mais le seuil d'intervention n'est pas atteint.

**Pas d'intervention aphicide spécifique.**

### Phoma

Avec les pluies de ces huit derniers jours, la maturité des périthèces se poursuit et les projections d'ascospores s'intensifient avec un pic de projection à Champenoux (54) le 16 octobre.

Compte tenu du stade avancé de la plupart des colzas, la valorisation d'une intervention fongicide sera sans doute très faible voire inexistante.

Le risque phoma concerne uniquement les colzas tardifs (moins de 4-5 feuilles) et les variétés sensibles ou peu sensibles : au cas où une intervention est décidée, choisissez un fongicide autorisé sur phoma.

## Céréales

Les plus avancées sont entre le stade 3 feuilles et début tallage.

### Pucerons

Le temps frais et pluvieux n'a pas permis le développement des quelques pucerons installés depuis la levée.

Tout traitement est donc actuellement inutile. Les pluies annoncées pour la semaine ne devraient pas leur permettre de se développer. Il est donc vraisemblable que nous n'aurons pas à traiter contre ce parasite cet automne, car si les pluies cessent, il est fort probable que les températures baisseront. Il faut cependant continuer à observer les semis les plus précoces.

### Cicadelles

Les traitements contre les cicadelles sont également inutiles.

### Désherbage

Les produits à base d'isoproturon pourront être appliqués dès que les conditions le permettront dans les parcelles atteignant le stade 3 feuilles.

Pour les produits à action foliaire, attendre la levée d'un maximum d'adventices.

### Colza :

Attendre en charançon.  
Risque climatique phoma en colza tardif.

### Céréales :

Pucerons,  
cicadelles :  
traitement inutile.

Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
38, rue Sainte Catherine  
54043 NANCY CEDEX  
☎ : 03.83.30.41.51  
Fax : 03.83.32.00.45  
  
Imprimé à la Station  
d'Avertissements Agricoles  
de Lorraine  
  
Le Directeur-Gérant :  
D. VERBEKE  
  
Publication périodique  
C.P.A.P. n° 2011 AD  
ISSN n° 0980-8507  
  
Abonnement annuel : 400 F



P203

03 40 J. 50614